

# active line Urinary active

ウリナリーアクティブ

トラブル部位別 加水分解タンパク使用の食事療法食 AFS入

泌尿器の健康維持食事療法食：下部尿路疾患・ストルバイト結晶

効果には個体差があります



米・魚粉(アンチョビ)・加水分解されたポテト・加水分解された魚蛋白・コーン油(ミックストコフェロールで保存)・魚油(ミックストコフェロールで保存)・海藻(アスコフィルム結節)・ミネラル(リン酸カルシウム・炭酸カルシウム・硫酸鉄・亜鉛アミノ酸キレート・硫酸亜鉛・銅アミノ酸キレート・硫酸銅・マンガン酸化物・ヨウ化カリウム・亜セレン酸ナトリウム)・ビール酵母・DL-メチオニン・乾燥酵母・FOS・塩化コリン・タウリン・ビタミン(E・PP・A・B12・B1・パントテン酸・B2・B6・ビオチン・D3・葉酸)・ユッカシジゲラ・ローズマリーエキス

AFS

加水分解された魚蛋白・加水分解されたポテト・ミネラル類・ハギ・クランベリー・セイヨウタンポポ・ローズマリーエキス

♥ AFS粒(ハート型タブレット)

さ 6 さ 3

エネルギー 369kcal 1

A コー 2 2 63 9



フィットセラピー

植物の抗酸化力を利用した非加熱圧縮粒

AFS粒はアクティブ・フレッシュ・システムという SanyPET社の世界特許技術で製造しています。

## 3つの有効成分によるAFSタブレット

フィット ミカル 分 物

DLメチオニン 酸 化 アミノ酸 酸 6 1 6

リン・ マ ネシウム ミネラル 結 化 リン マ ネシウム

水 加 ナトリウム ナトリウム 1 3

た ストル イト結 で 結  
アシ ーシス

ハギ リラックス 化

クランベリー 解 .

タンポポ( ) 解 解 酸化



## 給与量の目安／成分値

■ 給与量の目安（1日あたり：グラム）				
体重	1kg～3kg	3kg～4kg	4kg～6kg	6kg～8kg
一日の給与量	20g～45g	45g～55g	55g～75g	75g～90g

## 成分値

### [成分値]

粗タンパク質：28.00%、粗脂肪：15.50%、粗灰分：7.00%、粗繊維：2.00%、水分：8.00%

### [ミネラル]

カルシウム：1.20%、リン：1.00%、カリウム：1.00%、ナトリウム：0.20%、マグネシウム：0.05%、塩化物：1.30%  
硫黄：0.50%

### [ビタミン]

A：21000UI/kg、D3：1200UI/kg、E：200mg/kg、B1：8mg/kg、B2：5mg/kg、B6：5mg/kg、B12：0.02mg/kg  
ビオチン：0.10mg/kg、PP：100mg/kg、パントテン酸：7mg/kg、葉酸：1.1mg/kg、塩化コリン：2300mg/Kg  
硫酸鉄：290mg/Kg、硫酸亜鉛：130mg/Kg、亜鉛アミノ酸キレート：180mg/Kg、銅アミノ酸キレート：23mg/Kg  
硫酸銅：23mg/Kg、マンガン酸化物：11mg/Kg、ヨウ化カリウム：0.55mg/Kg、亜セレン酸ナトリウム：0.26mg/Kg

### [その他]

DLメチオニン：6900mg/kg、タウリン：1500mg/kg、Omega3：0.8%、Omega6：3.3%、ハギ：589mg/kg  
クランベリー：372mg/kg、セイヨウタンポポ：231mg/kg

★本品使用時は他の食事摂取を控え、本品のみを給餌してください。

他の食べ物と混ぜると効果が薄くなりますのでご注意ください。

★米国飼料検査官協会（AAFCO）の定める栄養ガイドラインに沿って製造しています。

本品と水だけで健康に生活できます。

当商品はミネラル（マグネシウム）の制限を行い、健康な尿形成を目的として猫下部尿路の健康維持の為に開発されています。

\*加水分解とは…

通常、摂食したたんぱく質は体内の消化器官でそれぞれの臓器ごとの消化酵素によって消化され(細かくなっていく)、アミノ酸になって体内に吸収されます。

タンパク>ペプチド>アミノ酸

この体内の消化分解処理を原料段階で分解処理し、アミノ酸にして腸管で吸収しやすく、その後血液中に入っても免疫反応を抑制する原料処理を加水分解といいます。



イタリアのドッグフード／キャットフード  
FORZA10(フォルツァディエチ) 輸入元・卸販売  
株式会社Tricco International (トリッコインターナショナル)  
兵庫県神戸市中央区海岸通3丁目1-1

